



## Alerta Sarampo

05 de Junho de 2018

**A Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis alerta que está investigando cinco casos suspeitos de sarampo de Porto Alegre. O caso índice tem história de viagem a Manaus e os demais são casos secundários relacionados ao primeiro.**

A Europa vem enfrentando um surto de sarampo desde 2016, apresentando mais de 20.000 casos confirmados e **35** mortes. Nas Américas, em **2017**, foram confirmados **895** casos, sendo todos os casos considerados importados ou relacionados à importação. No ano de **2018**, até dia 30/05, as Américas já registraram **1115** casos: Antigua e Barbuda (1), Canadá e EUA (35), Guatemala (1), México (4), Peru (2), Colômbia (21), sendo que a Venezuela já apresentou **904** casos confirmados. No Brasil, já foram confirmados **104 casos**, Roraima (81) Amazonas (22) e Rio Grande do Sul (1).

O caso confirmado do RS é residente de São Luiz Gonzaga. A criança, tem 1 ano de idade, não vacinada e realizou viagem com a família à Europa. Foi identificado genótipo B3, que está circulando na Europa e alguns países africanos e asiáticos no corrente ano.

Frente a esta situação é imprescindível detectar e notificar rapidamente qualquer caso **suspeito de sarampo**, o que possibilitará que as medidas de controle sejam realizadas oportunamente, interrompendo a cadeia de transmissão. Por isso, **todos os profissionais de saúde**, na assistência de um caso que preencha os critérios de suspeição, **notifiquem imediatamente (no momento do atendimento do paciente), via telefone, à Equipe de Vigilância em Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, pelos telefones 3289-2471 ou 3289-2472 (no horário comercial) ou pelo** telefone de plantão (de conhecimento dos serviços de saúde, à noite, finais de semana e feriados) para **imediata** definição da coleta de espécimes clínicos (sangue e swab naso/orofaríngeo) para diagnóstico laboratorial, que serão encaminhados através da vigilância.

**CASO SUSPEITO DE SARAMPO:** Todo indivíduo que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite

**Obs:** O paciente com suspeita de sarampo de nível ambulatorial deve ser orientado a manter isolamento respiratório domiciliar e, no serviço de saúde, o isolamento deve ser instalado desde o momento da triagem.